

# Prise en charge de l'hépatite C

Infection VHC chronique? (ARN-VHC qualitatif):  
 Oui ou Non → Si non, on arrête ici!



| <b>Requis pour envisager le traitement :</b>   |   |
|--|---|
| RAMQ valide  | Oui Non En démarche   |
| ARN quantitatif positif<br>*En présence d'un ARN bas, suivre l'ARN pour exclure une clairance spontanée en cours   | Oui Non Prescrit  |
| Génotypage de l'hépatite C   | Résultat :  |
| <b>Évaluation de la fibrose hépatique</b><br>FIB-4 : <a href="http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4">http://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/fib-4</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si &lt; 1.5 : fibrose non avancée</li> <li>• Si 1.5-3.25 : zone grise</li> <li>• &gt; 3.25 : fibrose avancée</li> </ul> Fibroscan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• F0 : absence de fibrose</li> <li>• F1 : fibrose portale sans septum</li> <li>• F2 : fibrose portale avec quelques septums</li> <li>• F3 : fibrose septale sans cirrhose</li> <li>• F4 : cirrhose</li> </ul> | <u>Score FIB-4 :</u><br><br>Date :<br><br><u>Score fibroscan:</u><br>Date : |
| Consommation active de drogues ou alcool   | Non<br>Non problématique<br>Problématique                                   |
| Risque de réinfection  | Faible<br>Élevé   |
| Adhérence à la méthadone/buprénorphine-naloxone  | Oui Non   |
| Adhérence acceptable aux RDV médicaux  | Oui Non   |
| Patient veut être traité   | Oui Non   |
| Déjà traité pour le VHC :  | Non<br>Réponse au traitement :  |
| <b>Choix du traitement</b>   |   |
| Choisir le traitement et sa durée (à discuter) :   |   |
| <a href="http://www.hcvguidelines.org/full-report/initial-treatment-">http://www.hcvguidelines.org/full-report/initial-treatment-</a>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <a href="#">hcv-infection</a>  |  |
| <b>Avant de prescrire un traitement :</b>  |  |
| Liste complète de la médication active :   |  |
| Vérifier la présence d'interactions médicamenteuses<br><a href="http://www.hep-druginteractions.org/">http://www.hep-druginteractions.org/</a>   | Compatibles<br>Changements faits                         |
| Assurances privées ou RAMQ   | Privées RAMQ Pas assuré                                  |
| Femme et homme en âge de procréer : s'assurer d'une méthode de contraception fiable *Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent être avisés de ne pas concevoir pendant et jusqu'à 6 mois après un traitement contenant de la ribavirine* | Contraception :  |
| <b>Interventions complémentaires à évaluer :</b>   |  |
| Vaccination VHA  | Immun En cours Refus                                     |
| Vaccination VHB  | Immun En cours Refus                                     |
| Anti-HbC positif?  | Attention aux cas de réactivation du VHB per-traitement  |
| Si cirrhose :<br>- OGD<br>- Écho abdo et alpha-foeto q 6 mois<br>- Calculer score Child-Pugh<br>- Référer en hépatologie si MELD > 15 ou décompensation hépatique  | Fait Prescrit SO<br>Fait Prescrit SO<br>Fait Prescrit SO |
| Si fibrose avancée ou co-infection VHB : écho <6 mois  | Fait Prescrit SO   |

Raison médicale autre pour ne pas traiter le patient:

---



---



---